

# Lapin de garenne

*Oryctolagus cuniculus*

Le Lapin vit  
en groupes  
familiaux  
autour  
des terriers.



---

ORDRE LAGOMORPHES | FAMILLE LÉPORIDÉS | LONGÉVITÉ 9 ANS

---

**DESCRIPTION** Le Lapin de garenne, plus petit que le Lièvre d'Europe, possède un pelage gris brun et des oreilles mesurant de 4 à 8 cm dont les pointes ne sont pas noires. Il mesure entre 35 et 50 cm. Sa queue, d'environ 4 cm, est de la même couleur que son pelage sur la partie dorsale, et blanche sur le dessous. Ses pattes postérieures sont adaptées pour le saut. Le Lapin ne présente pas de dimorphisme sexuel. Il se déplace pratiquement tout le temps par bonds plus ou moins rapides. Il est capable de courir jusqu'à 30-40 km/h. Le Lapin possède 2 paires d'incisives à la mâchoire supérieure (les rongeurs n'en possèdent qu'une paire).

**REPRODUCTION** Les mâles sont polygames. La reproduction a lieu de janvier au début de l'automne. La femelle peut faire de 3 à 5 portées par an. Après 30 jours environ de gestation, chaque portée est constituée en moyenne de 5 petits. Ils naissent nus et les yeux fermés dans un terrier nommé rabouillère, tapissé d'herbes sèches et de poils. Une lapine peut mettre bas 15 à 25 petits par an. La maturité sexuelle des lapereaux est atteinte à 4 ou 5 mois ; ceux nés tôt en saison peuvent se reproduire l'année de leur naissance. Cette forte productivité est compensée par une forte mortalité des jeunes (5 à 6 jeunes parviennent à l'âge adulte).

**RÉGIME ALIMENTAIRE** Le Lapin de garenne est un herbivore opportuniste. Il adapte son menu aux saisons et à son milieu.

Au printemps et en été, il s'alimente de pousses de plantes herbacées, surtout de graminées, de légumineuses, de plantes cultivées (céréales). En automne, il consomme également des fruits tombés au sol.

En hiver, il mange des végétaux ligneux et semi-ligneux : feuilles de ronce, ajoncs, écorces des jeunes arbres. Comme le Lièvre d'Europe, il digère ses aliments en deux fois, c'est la cæcotrophie.

Les aliments ingérés sont d'abord rejetés sous forme de petites crottes molles et humides riches en éléments nutritifs : les cæcotrophes. Celles-ci sont réabsorbées et transitent une seconde fois dans le tube digestif. Cela lui permet de tirer le meilleur profit de son alimentation.

**MODE DE VIE & COMPORTEMENT** L'espèce est organisée en groupes sociaux de 2 à 8 individus (5 à 7 en moyenne) ; les mâles et femelles dominants y assurent la majorité de la reproduction. Un ensemble de groupes sociaux constitue une colonie. Le lapin est actif surtout à l'aube et au crépuscule, périodes pendant lesquelles il se nourrit et exerce ses activités sociales avec ses congénères. Le jour, il reste à l'abri dans son terrier ou des gîtes confectionnés dans des herbes hautes ou des buissons. Le domaine vital du lapin varie de 500 m<sup>2</sup> à 5 ha. Cet animal très prolifique subit des taux de mortalité importants. Les principales causes sont la dégradation et la fragmentation de son habitat, les maladies (myxomatose, virus hémorragique ou RHD : rabbit haemorrhagic disease, coccidiose), la prédation (Renard, Putois, Fouine, Martre, Hibou grand-duc ...) et le trafic routier.



**HABITAT** Le Lapin de garenne fréquente tous les types de milieux : bois, lisières, bosquets, bocages, remblais, talus et coteaux, garrigues, dunes... à l'exception des grands massifs forestiers, des zones d'agriculture intensive et au-delà de 1200-1400 m d'altitude. Il a des préférences pour des sols légers, secs et filtrants (sablonneux) qui lui facilitent le creusement de son terrier. Il lui faut aussi une végétation épaisse ou des buissons pour se réfugier en cas de danger. D'origine méditerranéenne, le Lapin a été introduit depuis l'époque romaine jusqu'au Moyen-Âge dans la plupart des régions ; il est présent sur l'ensemble de la France.

**DIUERS** La présence du lapin se remarque aux amas de petites crottes (latrines) de 0,6 à 1,2 cm de diamètre et de couleur verdâtre à brun foncé. Elles servent au marquage du territoire par le mâle dominant qui laisse sur elles la sécrétion de ses glandes anales. Le mâle dominant marque aussi son territoire en grattant la terre ; on parle de grattis. On remarque également sa présence grâce aux terriers et aux coulées dans la végétation qui indiquent les zones de déplacement entre lieux de gagnage et garennes.



**EN BREF...**

**HABITAT**

Zones à végétation épaisse et buissonnante.

**TAILLE**

Corps : de 35 à 50 cm.

Queue : 4 cm.

Oreilles : 4 à 8 cm de long.

**POIDS**

1,2 à 2,5 kg.

**COULEURS**

Gris-brun.



**BRUIT**

Silencieux, sauf cris aigus de détresse.

On dit qu'il clapit, glapit ou couine.

En cas de danger il tambourine violemment le sol de ses pattes pour prévenir ses congénères.

**NOURRITURE**

Herbivore dont plantes herbacées, écorces de jeunes arbres, racines, bulbes, graines...

**REPRODUCTION**


Environ 5 petits par portée (3 à 5 portées par an).



# Carte de répartition

2011

- maille enquêtée avec au moins une observation
- maille enquêtée sans observation
- maille non enquêtée
- limites départementales



## Empreintes & voie

### PIED ANTÉRIEUR

Longueur : 2,7 à 3,5 cm

Largeur : 2 à 2,5 cm

### PIED POSTÉRIEUR

Longueur : 3,5 à 4 cm

Largeur : 2 à 2,5 cm

