Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

ORDRE **LAGOMORPHES** I FAMILLE **LÉPORIDÉS** I LONGÉVITÉ **9 ANS**

DESCRIPTION Le Lièvre d'Europe ou Lièvre brun est de taille moyenne et ne présente aucun dimorphisme sexuel. Il est plus grand et longiligne que le Lapin de garenne.

Son pelage varie du brun-gris au blond-roux avec des poils noirs sur les flancs et le dessus de la queue, le dessous est blanc crème. Le pelage estival est un peu plus clair que celui d'hiver. Il possède de grandes oreilles terminées par une pointe noire.

Ses yeux, proéminents, sont dorés. Les pattes du lièvre sont très développées (entre 11,5 et 15 cm) ; elles lui permettent de se déplacer par bonds et de prendre la course, jusqu'à 70km/h, pour esquiver l'attaque de certains prédateurs. Il peut faire des bonds jusqu'à 3 m de long. Le Lièvre d'Europe possède 2 paires d'incisives à la mâchoire supérieure (les rongeurs n'en possèdent qu'une paire).

REPRODUCTION La saison de reproduction des lièvres s'étend du mois de janvier à début octobre. Les mâles, ou « bouquins », sont polygames et se livrent à des combats (luttes, sauts, poursuites...) pour déterminer l'individu dominant qui s'accouplera avec les femelles appelées « hases ». Ces parades nuptiales sont appelées « bouquinage ». La durée de gestation est de 41 jours. La femelle peut être fécondée juste avant la mise-bas de sa portée : on parle

Le Lièvre peut courir jusqu'à 70km/h.

de superfœtation (l'intervalle entre 2 portées successives est ramené à 37-38 jours). Une hase a en moyenne 4 portées par an, de 2 à 4 levrauts par portée. Les levrauts naissent poilus à même le sol et voient dès leur naissance ; ils sont nidifuges et découvrent leur environnement dès les premiers jours en revenant téter leur mère une seule fois le soir. Ils sont sevrés avant l'âge d'un mois et leur croissance est très rapide (maturité sexuelle dès l'âge de 3-4 mois). Ils se dispersent, vers l'âge de 4 à 6 mois, certains à plusieurs kilomètres de leur lieu de naissance.

RÉGIME ALIMENTAIRE Le Lièvre d'Europe est herbivore et préfère les graminées sauvages et cultivées. Il consomme aussi des légumineuses (ou Fabacées), des feuilles et graines de céréales, des racines, des fruits, bourgeons ou légumes (choux, carottes). En hiver, il peut manger des feuilles de ronces et abroutir de jeunes arbres fruitiers et conifères. Comme le Lapin, le Lièvre d'Europe digère ses aliments en deux fois, c'est la cæcotrophie. Les aliments qu'il consomme sont d'abord rejetés par l'organisme sous forme de petites crottes molles et humides (cæcotrophes) enrichies en éléments nutritifs. Celles-ci sont réabsorbées et transitent donc une seconde fois dans le tube digestif. Cela lui permet de tirer le meilleur profit de son alimentation.

HABITAT Originaire des steppes d'Eurasie, le Lièvre d'Europe fréquente tous les milieux : plaine, bois, bord de mer, pelouses alpines (on peut le retrouver facilement en altitude jusqu'à 1800m). Il privilégie les espaces ouverts comme les zones cultivées à dominante céréalière.
Les zones de polyculture, d'élevage et de vigne lui sont favorables. Selon les saisons, il préfère certains types de milieux : en plaine en été et vers les bois lorsque le froid arrive.

EN BREF...

HABITAT
Tous les milieux mais préférentiellement les zones ouvertes à dominante céréalière.

TAILLE
De la tête à la queue : 48 à 70 cm.

POIDS
2,5 à 7 kg (3-5 kg en moyenne).

COULEURS
Fauve avec des poils noirs, dessous crème.

BRUIT
Le lièvre vagit ou couine.

NOURRITURE
Graminées et autres plantes herbacées sauvages ou cultivées, bourgeons, pousses et feuilles tendres, écorces d'arbustes ou d'arbres fruitiers.

REPRODUCTION
De 2 à 4 petits par portée (4 portées par an).

MODE DE VIE & COMPORTEMENT Le lièvre est essentiellement nocturne et crépusculaire, périodes pendant lesquelles il se nourrit et rencontre ses congénères. Espèce très sociable à tendance grégaire, le Lièvre mène la plupart de ses activités nocturnes en petits groupes de 2 à 6 individus, mais quelquefois jusqu'à 12-15, avec lesquels il entretient des relations sociales très développées. Il partage avec eux un domaine vital d'environ 300 ha. Pendant le jour, individualiste et casanier, il s'abrite dans un gîte sommairement aménagé, souvent une simple dépression à même le sol. Il possède plusieurs gîtes et va changer d'emplacement pratiquement chaque jour. Il peut aussi avoir quelques périodes d'activité en plein jour (printemps et été). Le Lièvre d'Europe ne creuse pas de terrier.

DIVERS La principale cause de diminution de la population est la recrudescence de certaines maladies type EBHS (European brown hare syndrome, qui est une hépatite virale), tularémie et pseudotuberculose. Le lièvre souffre aussi de mortalité par le machinisme agricole (fauche des prairies temporaires par exemple) et la circulation routière. Même s'il sait s'adapter aux changements de son environnement, la dégradation de son habitat (fermeture des milieux en particulier), constitue également une menace.

Une autre espèce, le Lièvre variable, vit dans les Alpes à une altitude supérieure à 1 300 mètres. Plus petit que le Lièvre d'Europe, il est brun en été et entièrement blanc en hiver hormis le bout noir de ses oreilles.

Carte de répartition

2011



Empreintes & voie

PIED ANTÉRIEUR
Longueur : 2,7 à 3,5 cm
Largeur : 2 à 2,5 cm

PIED POSTÉRIEUR
Longueur : 3,5 à 4 cm
Largeur : 2 à 2,5 cm